

Dexmedetomidina Solución Inyectable 200 mcg/2ml

Clasificación: Psicolépticos, otros hipnóticos y sedantes

Acción Terapéutica:

La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los receptores adrenérgicos α_2 con efectos sedantes, ansiolíticos, simpaticolíticos y ahorradores de analgésicos, y una mínima depresión de la función respiratoria.

Es potente y altamente selectivo para los receptores α_2 con una relación α_2 : α_1 de 1620:1. Los efectos hemodinámicos, que incluyen hipertensión transitoria, bradicardia e hipotensión, son resultado de las propiedades vasoconstrictoras y simpaticolíticas periféricas del fármaco. La dexmedetomidina ejerce su acción hipnótica a través de la activación de los receptores α_2 presinápticos y postsinápticos centrales en el locus coeruleus, induciendo así un estado de inconsciencia similar al sueño natural, con el aspecto único de que los pacientes permanecen fácilmente despertables y cooperativos.

Venta bajo receta médica

Composición:

Cada ml de solución inyectable contiene:

Clorhidrato de dexmedetomidina 100 mcg

Excipientes c.s.p.

Indicaciones:

La dexmedetomidina está indicada para la sedación de pacientes intubados y con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la sedación de pacientes no intubados, antes de y/o durante procedimientos diagnósticos o quirúrgicos (p.ej. para sedación de procedimiento / sedación consciente).

Forma de administración:

Vía Intravenosa

Posología:

- Según prescripción médica y lo administra un médico o un enfermero.

Presentaciones:

Caja x 5 ampollas de 2 ml c/u + bandeja plástica + inserto

Número de Registro Sanitario: 9872-MEE-0325